

LIVOGIVA®: Teriparatide

- Laboratoire : Theramex
- Médicament de référence : FORSTEO®
- Autres biosimilaires : Movymia®, Terrosa®



MODALITÉS DE PRESCRIPTION

- **Médicament d'exception** : ordonnance d'exception à 4 volets (liste I)
- Ordonnance par tout prescripteur



INDICATIONS

FORSTEO®

Traitement de l'ostéoporose chez les patients à risque élevé de fracture : ostéoporose post-ménopausique et ostéoporose masculine.

Traitement de l'ostéoporose cortisonique chez les femmes et les hommes à risque élevé de fracture recevant une corticothérapie au long cours par voie générale.

LIVOGIVA®



PRÉSENTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Même présentation que Forsteo : **20 µg/80 µL** en stylo prérempli

Conservation : au **réfrigérateur**. Le stylo doit être remis au réfrigérateur immédiatement après utilisation. Ne pas conserver le dispositif avec l'aiguille fixée dessus. Après la première utilisation, le produit peut être conservé pendant 28 jours entre 2 et 8°C.



POSOLOGIE

- Administration **SC** de 20 µg par jour dans la cuisse ou l'abdomen



INFORMATIONS PRATIQUES

- Durée totale maximale de 24 mois non renouvelable au cours de la vie du patient.
- Aiguilles non fournies : les fournir séparément (type aiguilles pour stylo injecteur d'insuline)



GESTION DES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES


EFFETS INDÉSIRABLES

Hypotension orthostatique

CONDUITE À TENIR

Peut survenir dans les 4h suivant l'injection et disparaît spontanément en quelques minutes à quelques heures, si besoin : mettre le patient en position allongée

Livogiva® présente une efficacité clinique similaire au niveau de l'augmentation des valeurs moyennes de base de la densité minérale osseuse de la colonne vertébrale L1-L4 avec son médicament biologique de référence.



Source :

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/livogiva-epar-public-assessment-report_en.pdf