

# ACCOFIL® : Filgrastim

- Laboratoire : Accord Healthcare France
- Médicament de référence : **NEUPOGEN®**
- Autres biosimilaires : Nivestim®, Tevagrastim®, Zarzio®



## MODALITÉS DE PRESCRIPTION

- PIH trimestrielle d'une durée de 3 mois (liste I)
- Renouvellement : par tout prescripteur, en ville, sur présentation de l'ordonnance initiale (datant de moins de 3 mois)



## POSOLOGIE

Administration en **SC** ou **IV** selon l'indication. La dose à administrer est définie par le médecin.

- Dilution possible dans une solution de glucose 5%, incompatible dans des solutions salines
- Sites d'injection SC : haut des cuisses, de l'abdomen (sauf région autour du nombril)  
Alterner les sites d'injection pour éviter le risque d'endolorissement d'un site



## INDICATIONS

### NEUPOGEN®

Mobilisation des cellules souches

Neutropénie après chimiothérapie cytotoxique

Neutropénie après thérapie myélosuppressive suivie de greffe de moelle osseuse

Neutropénie sévère congénitale, cyclique ou idiopathique

Neutropénie sévère chez le patient infecté par le VIH

### ACCOFIL®

✓ (SC, IV)

✓ (SC++, IV)

✓ (SC, IV)

✓ (SC)

✓ (SC)



## PRÉSENTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Mêmes dosages que Neupogen® : **30 MU, 48 MU**.  
Pas de présentation en flacon : uniquement des seringues pré-remplies à **usage unique**
- Boîte de 1 ou de 5 seringues pré-remplies

**Conservation** : une exposition accidentelle à des températures de congélation, jusqu'à 24h, n'affecte pas la stabilité. Après dilution : maximum **24h** au réfrigérateur.

**Au réfrigérateur** ou maximum **15 jours** à T° ambiante.

# ACCOFIL® : Filgrastim



## SURVEILLANCES SPÉCIFIQUES


Pendant le traitement : fonction rénale, formule sanguine, volume splénique.



## GESTION DES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES

| EFFETS INDÉSIRABLES           | CONDUITE À TENIR  |
|-------------------------------|---|
| Fièvre                        | Pas de prise de paracétamol en automédication, consulter le médecin |
| Infections                    | Pas d'automédication, si fièvre consulter le médecin                |
| Anémie                        | Surveillance NFS  |
| Diminution de l'appétit       | Surveillance du poids   |
| Réactions au site d'injection | Alterner les sites d'injection                                      |

Accofil® présente une efficacité similaire au niveau clinique sur l'augmentation des polynucléaires neutrophiles avec son médicament biologique de référence.



Adapté de :

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/accofil-epar-public-assessment-report\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/accofil-epar-public-assessment-report_en.pdf)