

HYRIMOZ®: Adalimumab

- Laboratoire : Sandoz
- Médicament de référence : **HUMIRA®**
- Autres biosimilaires : Amgevita®, Amsparity®, Hulio®, Idacio®, Imraldi®, Yuflyma®



MODALITÉS DE PRESCRIPTION

- **Médicament d'exception** : ordonnance d'exception à 4 volets (liste I)
- PIH réservée à certains médecins spécialistes : en dermatologie, hépato/gastro-entérologie, médecine interne, ophtalmologie, pédiatrie et rhumatologie.
- Renouvellement possible par ces mêmes spécialistes en ville sur présentation simultanée de la PIH même si elle date de plus d'1 an



PRÉSENTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- **40 mg** : seringue ou stylo prérempli à **usage unique**, avec aiguille et protège aiguille, boîte de 2
Pas de présentation en 20 mg et 80 mg.

Conservation : au **réfrigérateur** et maximum **21 jours** à température ambiante



SURVEILLANCES SPÉCIFIQUES

- Carte de surveillance pour les patients traités par Hyrimoz®
- Avant le traitement : dépistage des infections (tuberculose, VHB...), radiographie thoracique (pour rechercher une infection tuberculeuse active ou non), surveillance dermatologique (recherche d'un cancer cutané autre que mélanome)
- Pendant le traitement et jusqu'à 4 mois après l'arrêt du traitement : dépistage des infections, surveillance dermatologique



INDICATIONS

HUMIRA®	HYRIMOZ®
Polyarthrite rhumatoïde	✓
Spondyloarthrite axiale	✓
Rhumatisme psoriasique	✓
Psoriasis	✓
Hidrosadénite suppurée	✓
Maladie de Crohn	✓
Rectocolite hémorragique	✓
Uvéite	✓
Arthrite juvénile idiopathique	✓



POSOLOGIE

Administration **SC** toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Le schéma posologique est défini par le médecin.

HYRIMOZ®: Adalimumab

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le capuchon de l'aiguille du stylo prérempli contient du caoutchouc naturel sec (un dérivé du latex)
- Pas de remboursement dans l'hidrosadénite suppurée, dans la polyarthrite rhumatoïde sévère active et évolutive chez les adultes non précédemment traités par le méthotrexate.



GESTION DES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES

EFFETS INDÉSIRABLES

Infections (infections des voies respiratoires, infections opportunistes...)

Réactions au site d'injection

Cancer de la peau


CONDUITE À TENIR

Eviter l'automédication.
Si fièvre, consulter le médecin
Etre à jour dans ses vaccins

Alterner les sites d'injection

Protection contre les UV (crème solaire, chapeau...), surveillance dermatologique

Hyrimoz® présente une efficacité similaire au niveau clinique sur l'amélioration des scores PASI50, PASI75, PASI90 et PASI100 (zone atteinte et sévérité du psoriasis) avec son médicament biologique de référence.



Source :

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/hyrimoz-epar-public-assessment-report_en.pdf