

# ERELZI®: Etanercept

- Laboratoire : Sandoz
- Médicament de référence : **ENBREL®**
- Autres biosimilaires : Benepali®, Nepexto®



## MODALITÉS DE PRESCRIPTION

- **Médicament d'exception** : ordonnance d'exception à 4 volets (liste I)
- PIH réservée à certains spécialistes : en dermatologie, médecine interne et en rhumatologie
- Renouvellement possible par ces mêmes spécialistes en ville sur présentation simultanée de la PIH même si elle date de plus d'1 an



## INDICATIONS

### ENBREL®

Polyarthrite rhumatoïde

Rhumatisme psoriasique

Spondyloarthrite axiale

Psoriasis en plaques

Arthrite juvénile idiopathique

Psoriasis en plaques de l'enfant

### ERELZI®



## POSOLOGIE

Administration en **SC**.

Le schéma posologique est défini par le médecin et dépend de l'indication.

Alterner les sites d'injection : cuisses, abdomen ou zone arrière du haut des bras.



## PRÉSENTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

- Solution injectable en seringue pré-remplie à **25 mg** et **50 mg**, avec aiguille et protège aiguille, à **usage unique** : boîte de 4
- Solution injectable en stylo pré-rempli à **50 mg**, avec aiguille, à **usage unique** : boîte de 4

Absence de présentations en flacons de 10 mg, flacons de 25 mg, stylos de 25 mg.

**Conservation** : avant ouverture au réfrigérateur ou à T° ambiante pour une durée unique maximale de **28 jours**.

# ERELZI®: Etanercept



## SURVEILLANCES SPÉCIFIQUES

- Avant le traitement : test à la tuberculine, dépistage d'une infection par le virus de l'hépatite B, radiographie thoracique
- Pendant le traitement : dépistage des infections

## INFORMATIONS PRATIQUES



- Carte de surveillance pour les patients traités par Erelzi®
- Contraception chez les femmes en âge de procréer et jusqu'à 3 semaines après l'arrêt



## GESTION DES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES

### EFFETS INDÉSIRABLES

Réactions au site d'injection


Infections

### CONDUITE À TENIR

Alterner les sites d'injection

Pas d'automédication, consulter le médecin en cas de fièvre

Erelzi® présente une efficacité similaire au niveau clinique sur l'amélioration des scores PASI 50, PASI 75 et PASI 90 (zone atteinte et sévérité du psoriasis) avec son médicament biologique de référence.



Source:

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/erelzi-epar-public-assessment-report\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/erelzi-epar-public-assessment-report_en.pdf)